Deux nouveaux Coléoptères de Java

par
M. PIC.

Je dois la connaissance des deux nouvelles espèces décrites ici (et dont je possède des paratypes) aux communications de J. B. Corporaal; elles proviennent du récolteur F. C. Drescher, et ont été trouvées dans un champignon (Fomes melanoporus Mont) à Java.

Xylographus javanus n.sp. (Cisidae)

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, sparse griseo pubescens, niger, palpis labro antennisque ad basin testaceis, capite diverse, abdomine et pedibus brunneis. Antennis brevibus, articulis tribus ultimis brevibus et latissimis, brunneis; thorace marginato, elongato, antice attenuato, medio subarcuato, lateraliter postice fere recto, diverse pro parte sat fortiter et sparse punctato; scutello triangulare, laeve; elytris thorace non latioribus, sat elongatis, postice breve attenuatis, anguste marginatis, diverse pro parte fortiter non dense, pro parte fere regulariter punctatis; pedibus brevibus et latis, tibiis excavatis et externe spinolosis. Long 4—4.5 mill.

Java : Goenoeng Tangkoeban Prahoe.

Var. Thorace pro parte rufo et elytris lateraliter rufo marginatis (var. nov. *rufomarginatus*). Un exemplaire.

Peut se placer près de *X. ceylonicus* Ancey, en diffère par la forme plus allongée, le thorax moins court, plus fortement rétréci en avant, les élytres sans pli huméral brillant.

Labidocera Drescheri n.sp. (Tenebrionidae)

Oblongo-elongata, nitida, subconvexa, luteo pubescens, rufa. Capite lato, minute plus minusve sparse punctato, ante oculos in mare paulo tuberculato-nitido, oculis, minutis, valde distantibus; antennis brevibus, pro majore parte dilatatis, articulis primis gracilibus, scapo particulare, elongato, apice ♂ intus plus minusve longe et paulo arcuato dentate-spinoso, ♀ apice plus minusve angulato; thorace capite paulo latiore, parum breve, antice sat, et postice paulo, attenuato, lateraliter anguste marginato, plus minusve minute non dense punctato; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, sat minute, irregulariter non dense punctatis; pedibus gracilibus. Long. 2,5—3 mill.

Java : Goenoeng Tangkoeban Prahoe.

Se distingue de *L. abnormis* Geb. par la forme moins robuste, le thorax moins transversal, la dent qui prolongue le scape chez le ♂ différente, non fortement coudée a l'extrémité.